

والدین گرامی:

در صورت مشاهده هر یک از **نشانه های خطر** در کودک **فورا** به **نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی** مراجعه کنید:

علائم خطر در کودک زیر ۲ ماه:

- ۱- **کاهش قدرت مکیدن**
- ۲- **کاهش سطح هوشیاری** (شیرخوار شدیداً خواب آلود و بی حال است و فقط به تحریکات دردناک پاسخ می دهد)
- ۳- **تشنج** (حرکات غیر عادی)
- ۴- **تنفس تند** (۶۰ بار در دقیقه یا بیشتر)
- ۵- **تب** (دمای بالای ۳۷.۵ درجه سانتی گراد)
- ۶- **پایین بودن درجه حرارت بدن** (دمای کمتر از ۳۶.۵ درجه سانتی گراد)
- ۷- **تحریک پذیری و بیقراری**
- ۸- **تحریک کمتر از معمول و بی حالی**
- ۹- **برآمدگی ملاج**
- ۱۰- **تو کشیده شدن قفسه سینه**
- ۱۱- **عفونت چشم، پستان، ناف و پوست**
- ۱۲- **استفراغ مکرر**
- ۱۳- **پرش پره های بینی، ناله کردن**
- ۱۴- **زردی ۲۴ ساعت اول**
- ۱۵- **جوش چرکی پوستی**





علائم خطر در کودک ۲ ماهه تا ۵ ساله :

۱- فقدان تنفس یا تنفس منقطع

۲- سیانوز مرکزی (کبودی لب ها و مخاط دهان)

۳- رنگ پریدگی شدید

۴- در حال تشنج (کودک از قبل سابقه بیماری صرع یا مصرف داروی ضد تشنج

نداشته باشد)

۵- کودک قادر به نوشیدن یا شیر خوردن نباشد.

۶- هر چیزی که می خورد استفراغ می کند.

۷- در جریان این بیماری تشنج کند.

۸- کودک بی حالی یا خواب آلودگی غیر عادی دارد.

۹- بیهوشی یا کاهش شدید سطح هوشیاری (یعنی کودک بیمار فقط در صورت یک تحریک دردناک (مثل نیشگون گرفتن) واکنش نشان می دهد و

یا هیچ واکنشی به هیچگونه محرکی ندارد.

